


Anteil der Hauptdiagnosegruppen nach Alter bei Diagnose

Hauptdiagnosegruppen gemäss ICC3-3¹ und Langerhans-Zell-Histiozytose; Anteil in Prozent der Fälle im Zeitraum 1995–2024




Datenstand: 21.07.2026
Veröffentlicht: 07.08.2026
Datenquelle: KiKR, BFS

¹ Steliarova-Foucher E. et al. International Classification of Childhood Cancer, Third edition. *Cancer* 2005;103:1457–67. doi: 10.1002/cncr.20910. PMID: 15712273.

Inzidenz

Nach Hauptdiagnosegruppen, Altersgruppe und 10-Jahres-Zeiträumen


Hauptdiagnosegruppen gemäss ICC3-3¹ und Langerhans-Zell-Histiozytose; Rohe Rate pro 100,000 Personen und Jahr; Fehlerbalken repräsentieren 95%-Vertrauensintervalle



Inzidenz

Nach Geschlecht, Hauptdiagnosegruppen, und 10-Jahres-Zeiträumen


Hauptdiagnosegruppen gemäss ICC3-3¹ und Langerhans-Zell-Histiozytose; Rohe Rate pro 100,000 Personen und Jahr; Fehlerbalken repräsentieren 95%-Vertrauensintervalle



Inzidenz

Nach Geschlecht, Altersgruppe und 5-Jahres-Zeiträumen

Rohe Rate pro 100,000 Personen und Jahr; Fehlerbalken repräsentieren 95%-Vertrauensintervalle



Krebs bei Kindern (0-14 Jahre alt), 2005-2014

Nach Hauptdiagnosegruppen

Anzahl Fälle (relative Häufigkeit %), mittleres Alter bei der Diagnose (in Jahren), Inzidenz pro 100,000 Personen und Jahr, und Geschlechterverhältnis; Hauptdiagnosegruppen gemäss ICC-3¹ und Langerhans-Zell-Histiozytose

Krebsart	n(%)	Alter bei Dx (Median)	Inzidenz	Geschlechter- verhältnis (männlich: weiblich)
I Leukämien	645 (31.9%)	4.00	5.41	1.52
II Lymphome	235 (11.6%)	10.00	1.97	1.73
III Hirn- und andere ZNS-Tumore	484 (23.9%)	6.00	4.06	1.22
IV Neuroblastome	120 (5.9%)	1.00	1.01	1.18
V Retinoblastome	42 (2.1%)	1.00	0.35	0.83
VI Nierentumore	98 (4.8%)	3.00	0.82	0.78
VII Lebertumore	18 (0.9%)	1.00	0.15	1.57
VIII Knochentumore	83 (4.1%)	11.00	0.70	0.93
IX Weichteilsarkome	142 (7.0%)	7.00	1.19	1.33
X Keimzelltumore	64 (3.2%)	6.00	0.54	1.13
XI Andere Karzinome und Melanome	90 (4.4%)	12.00	0.75	0.48
XII Andere und unspezifizierte Neubildungen	4 (0.2%)	1.50	0.03	3.00
Insgesamt (ohne Langerhans-Zell-Histiozytose)	2025 (100.0%)	6.00	16.99	1.26
Langerhans-Zell-Histiozytose	42 (2.0%)	4.50	0.35	1.21
Insgesamt (inkl. Langerhans-Zell-Histiozytose)	2067 (100.0%)	6.00	17.34	1.26

Abkürzungen: Dx Diagnose

¹ Steliarova-Foucher E. *et al.* International Classification of Childhood Cancer, Third edition. *Cancer* 2005;103:1457-67.doi: 10.1002/cncr.20910. PMID: 15712273.

Datenstand: 21.07.2026

Veröffentlicht: 07.08.2026

Datenquelle: KiKR, BFS

Krebs bei Kindern (0-14 Jahre alt), 2015-2024

Nach Hauptdiagnosegruppen

Anzahl Fälle (relative Häufigkeit %), mittleres Alter bei der Diagnose (in Jahren), Inzidenz pro 100,000 Personen und Jahr, und Geschlechterverhältnis; Hauptdiagnosegruppen gemäss ICC-3¹ und Langerhans-Zell-Histiozytose

Krebsart	n(%)	Alter bei Dx (Median)	Inzidenz	Geschlechter- verhältnis (männlich: weiblich)
I Leukämien	642 (26.9%)	5.00	4.97	1.23
II Lymphome	271 (11.3%)	9.00	2.10	2.01
III Hirn- und andere ZNS-Tumore	646 (27.1%)	7.00	5.00	1.01
IV Neuroblastome	151 (6.3%)	1.00	1.17	0.99
V Retinoblastome	64 (2.7%)	0.00	0.50	1.46
VI Nierentumore	113 (4.7%)	3.00	0.87	0.92
VII Lebertumore	37 (1.5%)	1.00	0.29	1.18
VIII Knochentumore	103 (4.3%)	11.00	0.80	0.66
IX Weichteilsarkome	141 (5.9%)	5.00	1.09	0.74
X Keimzelltumore	68 (2.8%)	10.00	0.53	0.79
XI Andere Karzinome und Melanome	146 (6.1%)	12.00	1.13	0.82
XII Andere und unspezifizierte Neubildungen	6 (0.3%)	7.00	0.05	0.20
Insgesamt (ohne Langerhans-Zell-Histiozytose)	2388 (100.0%)	6.00	18.48	1.09
Langerhans-Zell-Histiozytose	58 (2.4%)	5.50	0.45	0.76
Insgesamt (inkl. Langerhans-Zell-Histiozytose)	2446 (100.0%)	6.00	18.93	1.08

Abkürzungen: Dx Diagnose

¹ Steliarova-Foucher E. *et al.* International Classification of Childhood Cancer, Third edition. *Cancer* 2005;103:1457-67.doi: 10.1002/cncr.20910. PMID: 15712273.

Datenstand: 21.07.2026
Veröffentlicht: 07.08.2026
Datenquelle: KiKR, BFS

Krebs bei Jugendlichen (15-19 Jahre alt), 2005-2014

Nach Hauptdiagnosegruppen

Anzahl Fälle (relative Häufigkeit %), mittleres Alter bei der Diagnose (in Jahren), Inzidenz pro 100,000 Personen und Jahr, und Geschlechterverhältnis; Hauptdiagnosegruppen gemäss ICC-3¹ und Langerhans-Zell-Histiozytose

Krebsart	n(%)	Alter bei Dx (Median)	Inzidenz	Geschlechter- verhältnis (männlich: weiblich)
I Leukämien	106 (9.1%)	16.00	2.37	1.52
II Lymphome	279 (24.0%)	17.00	6.24	1.03
III Hirn- und andere ZNS-Tumore	168 (14.5%)	16.00	3.76	1.20
IV Neuroblastome	3 (0.2%)	18.50	0.06	NA*
V Retinoblastome	0 (0.0%)	NA	0.00	NA
VI Nierentumore	11 (1.0%)	16.50	0.25	1.43
VII Lebertumore	4 (0.4%)	18.00	0.09	NA*
VIII Knochentumore	69 (6.0%)	16.00	1.55	1.40
IX Weichteilsarkome	74 (6.4%)	16.50	1.66	1.51
X Keimzelltumore	152 (13.1%)	18.00	3.40	5.23
XI Andere Karzinome und Melanome	288 (24.8%)	18.00	6.45	0.55
XII Andere und unspezifizierte Neubildungen	7 (0.6%)	17.00	0.15	0.85
Insgesamt (ohne Langerhans-Zell-Histiozytose)	1161 (100.0%)	17.00	25.99	1.18
Langerhans-Zell-Histiozytose	2 (0.2%)	19.00	0.04	NA*
Insgesamt (inkl. Langerhans-Zell-Histiozytose)	1162 (100.0%)	17.00	26.03	1.18

Abkürzungen: Dx Diagnose, NA nicht anwendbar (*Daten nicht angezeigt, um die Offenlegung von Alter/Geschlecht der einzelnen Patienten)

¹ Steliarova-Foucher E. *et al.* International Classification of Childhood Cancer, Third edition. *Cancer* 2005;103:1457-67.doi: 10.1002/cncr.20910. PMID: 15712273.

Datenstand: 21.07.2026

Veröffentlicht: 07.08.2026

Datenquelle: KiKR, BFS

Krebs bei Jugendlichen (15-19 Jahre alt), 2015-2024

Nach Hauptdiagnosegruppen

Anzahl Fälle (relative Häufigkeit %), mittleres Alter bei der Diagnose (in Jahren), Inzidenz pro 100,000 Personen und Jahr, und Geschlechterverhältnis; Hauptdiagnosegruppen gemäss ICC-3¹ und Langerhans-Zell-Histiozytose

Krebsart	n(%)	Alter bei Dx (Median)	Inzidenz	Geschlechter- verhältnis (männlich: weiblich)
I Leukämien	129 (10.8%)	17.0	2.98	1.67
II Lymphome	291 (24.4%)	17.0	6.75	1.29
III Hirn- und andere ZNS-Tumore	231 (19.3%)	17.0	5.34	0.70
IV Neuroblastome	9 (0.8%)	17.0	0.21	0.15
V Retinoblastome	1 (0.1%)	NA*	0.03	NA*
VI Nierentumore	8 (0.6%)	16.0	0.18	0.73
VII Lebertumore	1 (0.1%)	NA*	0.02	NA*
VIII Knochentumore	69 (5.7%)	17.0	1.59	1.75
IX Weichteilsarkome	66 (5.5%)	17.0	1.52	1.42
X Keimzelltumore	114 (9.5%)	17.0	2.63	2.97
XI Andere Karzinome und Melanome	272 (22.8%)	17.0	6.30	0.52
XII Andere und unspezifizierte Neubildungen	5 (0.4%)	17.5	0.11	NA*
Insgesamt (ohne Langerhans-Zell-Histiozytose)	1195 (100.0%)	17.0	27.67	1.03
Langerhans-Zell-Histiozytose	9 (0.8%)	17.0	0.21	1.71
Insgesamt (inkl. Langerhans-Zell-Histiozytose)	1204 (100.0%)	17.0	27.88	1.04

Abkürzungen: Dx Diagnose, NA nicht anwendbar (*Daten nicht angezeigt, um die Offenlegung von Alter/Geschlecht der einzelnen Patienten)

¹ Steliarova-Foucher E. *et al.* International Classification of Childhood Cancer, Third edition. *Cancer* 2005;103:1457-67.doi: 10.1002/cncr.20910. PMID: 15712273.

Datenstand: 21.07.2026
Veröffentlicht: 07.08.2026
Datenquelle: KiKR, BFS